


 ASL Nuoro Azienda socio-sanitaria locale	REGIONE SARDEGNA - ASL Nuoro Direzione Generale	NU_004_ ALL.15 INDICAZIONI ALERT
	PDTA BPCO	
INDICAZIONI ALERT		

ALERT MANCATA MISURAZIONE (per tutti i parametri)


N° MISURAZIONI < AL PREVI- STO	Alert attivo per CTM	Se malfunzionamento	CTM attiva assist. tecnica (SOF)
	Risposta: Contatto telefonico al paziente/caregiver da parte della CTM per de- finire la causa.	Se dimenticanza	CTM sollecita
		Se Morte/ricovero	CTM sospende telemonitoraggio
		Se non disponibilità a proseguire	CTM allerta IFeC che procede con sollecito telefonico


ALERT CLINICO

IPERTENSIONE			
PRESSIONE ARTERIOSA	Se PA $\geq 180/90$ mmHg	Contatto telefonico del paziente/caregiver da parte della CTM che: <ul style="list-style-type: none"> Verifica: assunzione della terapia, nel caso di paziente comorbido, tecnica di rilevazione, malfunzionamento (riferito) dei device (eventuale attivazione di assistenza tecnica). Richiede nuova misurazione (anche a distanza di qualche ora). Se misurazione nella norma prosegue come da schema secondo livello di intensità di monitoraggio. Se confermata, la CTM contatta IFeC.	Contatto IFeC-paziente (in presenza o in teleassistenza). L'IFeC riporta la sua valutazione al MMG e al Referente clinico. Se l'IFeC non è autonomo nella gestione della problematica, allerta il Referente clinico. Il referente clinico valuta se effettuare la visita in presenza o tramite televisita.
	Se PA $\geq 150/90$ mmHg (ma $< 180/90$ mmHg) <i>nessuna azione della CTM per il singolo valore</i>	Se ≥ 3 misurazioni consecutive secondo schema di monitoraggio $> 150/90$ mmHg, contatto telefonico del paziente da parte della CTM che: <ul style="list-style-type: none"> Verifica malfunzionamento (riferito) dei device (eventuale attivazione di assistenza tecnica); Richiede nuova misurazione (anche a distanza di qualche ora). Se misurazione nella norma prosegue come da schema secondo livello di intensità di monitoraggio.	Contatto IFeC-paziente (in presenza o in teleassistenza). L'IFeC riporta la sua valutazione al MMG e al Referente clinico. Se l'IFeC non è autonomo nella gestione della problematica, allerta il Referente clinico.

 ASL Nuoro Azienda socio-sanitaria locale	REGIONE SARDEGNA - ASL Nuoro Direzione Generale	NU_004_ ALL.15 INDICAZIONI ALERT
	PDTA BPCO	
INDICAZIONI ALERT		

		Se confermata, la CTM contatta IFeC.	Il referente clinico valuta se effettuare la visita in presenza o tramite televisita. Se non autonomo nella gestione (es. aumentare numero di misurazioni e/o variare orari) procede con teleconsulto cardiologico o con prescrizione visita cardiologica.
	IPOENSIONE		
	Se PAS<100 mmHg	<p>Contatto telefonico del paziente/caregiver da parte della CTM che:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifica: assunzione della terapia nel caso di paziente comorbido, tecnica di rilevazione, malfunzionamento (riferito) dei device (eventuale attivazione di assistenza tecnica). Richiede nuova misurazione. <p>Se misurazione nella norma prosegue come da schema secondo livello di intensità di monitoraggio.</p> <p>Se confermata, la CTM contatta IFeC</p>	<p>Contatto IFeC-paziente (in presenza o in teleassistenza).</p> <p>L'IFeC riporta la sua valutazione al MMG e al Referente clinico.</p> <p>Se l'IFeC non è autonomo nella gestione della problematica, allerta il Referente clinico.</p> <p>Il referente clinico decide se effettuare la visita in presenza o tramite televisita per valutare eventuali modifiche terapeutiche, stato di idratazione, altri segni/sintomi e trend pressorio (modifica delle soglie in base al trend).</p> <p>SE TREND DI IPOENSIONE CONFERMATO, IN ASSENZA DI SINTOMI ACUTI, PRESCRIVE EVENTUALE VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO.</p>

 ASL Nuoro Azienda socio-sanitaria locale		REGIONE SARDEGNA - ASL Nuoro Direzione Generale	NU_004_ ALL.15 INDICAZIONI ALERT
		PDTA BPCO	
INDICAZIONI ALERT			
SATURAZIONE	SATURAZIONE <92%* *NB: valore modificabile su trend del paziente	Contatto telefonico del paziente/caregiver da parte della CTM che: <ul style="list-style-type: none"> • Verifica tecnica di rilevazione e/o malfunzionamento (riferito) dei device (eventuale attivazione di assistenza tecnica). • Verifica assunzione terapia broncodilatatoria • Richiede nuova misurazione. Se misurazione nella norma prosegue come da schema secondo livello di intensità di monitoraggio. Se confermata, la CTM contatta IFeC	Contatto IFeC-paziente (in presenza o in teleassistenza) (vedi domande) L'IFeC riporta la sua valutazione al MMG e al Referente clinico. Se l'IFeC non è autonomo nella gestione della problematica, allerta il Referente clinico. Il referente clinico valuta se effettuare la visita in presenza o tramite televisita e prescrive eventuale rivalutazione pneumologico
TEMPERATURA	TEMPERATURA >38°	Contatto telefonico del paziente/caregiver da parte della CTM che: <ul style="list-style-type: none"> • Verifica tecnica di rilevazione e/o malfunzionamento (riferito) dei device (eventuale attivazione di assistenza tecnica). • Richiede nuova misurazione. Se misurazione nella norma prosegue come da schema secondo livello di intensità di monitoraggio. Se confermata, la CTM contatta IFeC	Contatto IFeC-paziente (in presenza o in teleassistenza). L'IFeC riporta la sua valutazione al MMG e al Referente clinico. Se l'IFeC non è autonomo nella gestione della problematica, allerta il Referente clinico. Il referente clinico valuta se effettuare la visita in presenza o tramite televisita.

 ASL Nuoro Azienda socio-sanitaria locale	REGIONE SARDEGNA - ASL Nuoro Direzione Generale		NU_004_ ALL.15 INDICAZIONI ALERT
	PDTA BPCO		
INDICAZIONI ALERT			
DOMANDE SUI SINTOMI	Domande prestabilite CTM: 1) ha la febbre? 2) è aumentata la tosse? 3) è aumentato l'affanno? 4) quanti litri ossige- no sta facendo al giorno e per quante ore?	In occasione del contatto periodico la CTM pone le domande previste e in caso di una o più risposte affermative, contatta l'IFeC.	L'IFeC, a sua volta, approfondi- sce i sintomi con le seguenti domande poste in teleassisten- za: 5) il respiro è sibilante? 6) ha le caviglie gonfie? 3) come sono le secrezioni ("catarro")? 7) sta urinando regolarmente? L'IFeC valuta se recarsi al domici- lio del paziente e riporta i sintomi registrati e la sua valutazione al MMG e al Referente clinico. Se l'IFeC non è autonomo nella gestione della problematica, allerta il Referente clinico. Il referente clinico valuta se effet- tuare la visita in presenza o tramite televisita ed eventualmente richie- dere una visita specialistica.